

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

SERINGUE INJECTABLE DE KENACORT RETARD

FICHE N° 12952

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines :

Organisme : Université d' Auvergne, Faculté de médecine et de pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :

Description

C'est une boîte en carton rectangulaire blanche et jaune. Elle contient une seringue en plastique de 5 mL et deux aiguilles contenues individuellement dans des caches verts et oranges.

Une ampoule bouteille est emballée individuellement.

Utilisation

Ce dispositif est destiné pour des injections intra-musculaires ou intra-articulaires profondes. On l'utilise pour les traitements en pneumologie, allergologie, rhumatologie.

Doses : 1 à 3 mL tous les 10 jours (musculaire)

0.25 à 2 mL tous les 2 ou 3 semaines (intra-musculaire).

KENACORT RETARD

suspension injectable



SQUIBB

Le KENACORT RETARD est une forme injectable par voies intramusculaire et locales de l'Acétonide de Triamcinolone, dérivé cortisonique à activité anti-inflammatoire et anti-allergique élevée. 1 ml de suspension aqueuse contient 40 mg d'Acétonide de Triamcinolone. La nature microcristalline de cette suspension permet au principe actif d'être libéré lentement, ce qui confère au produit une action thérapeutique particulièrement prolongée (10 jours à 5 semaines selon les cas).

FORMULE :

Acétonide de Triamcinolone quarante milligrammes
Alcool benzylique 9 mg
Excipient Q.S.P. 1 ml de suspension aqueuse par ampoule autocassable

INDICATIONS :

— Voie intramusculaire :

- Toutes les indications de la cortisonothérapie générale à court ou à long terme en Pneumologie, Allergologie, Rhumatologie...

— Voies locales :

- Injections intra-articulaires ou périarticulaires en Rhumatologie.
- Infiltrations intralésionnelles dans le traitement des chéloïdes secondaires.

CONTRE-INDICATIONS :

Toutes les contre-indications classiques de la cortisonothérapie, notamment les ulcères gastro-duodénaux ou les antécédents d'ulcères digestifs, le diabète et l'hypertension artérielle. L'emploi de ce médicament est contre-indiqué en cas de grossesse ou de présomption de grossesse.

Le KENACORT RETARD ne sera injecté ni par voie intravasculaire, ni dans le tissu cellulaire sous-cutané, ni en milieu infecté.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

Se conformer strictement aux prescriptions du médecin. Bien agiter le flacon avant usage.

— Voie intramusculaire :

Les injections se font par voie intramusculaire profonde, dans le muscle fessier. Selon les cas, les doses de début peuvent varier entre 40 et 120 mg (1 à 3 ml) tous les 10 jours. Compte tenu des effets obtenus, ces doses seront par la suite réduites au minimum alors que l'intervalle entre les injections pourra être porté à 2 ou 3 semaines, voire à un mois ou plus, dans certains cas.

Les manifestations allergiques saisonnières cèdent le plus souvent à une seule injection de 1 à 3 ml.

Si les doses sont élevées et le traitement prolongé, la surveillance médicale sera rigoureuse et les précautions classiques inhérentes à toute cortisonothérapie seront prises.

— Voies locales :

La dose administrée à chaque injection varie entre 10 et 80 mg (0,25 à 2 ml). L'intervalle entre les injections s'étendra en moyenne sur 2 à 3 semaines. Des précautions d'asepsie rigoureuse seront prises à chaque injection. Celles-ci ne seront jamais faites dans le tissu cellulaire sous-cutané.

PRÉSENTATION :

1 ampoule autocassable de 1 ml de suspension contenant 40 mg d'Acétonide de Triamcinolone, 1 seringue de 5 ml et 2 aiguilles stériles à usage unique.

Laboratoires Squibb
143, avenue de Malakoff
75116 Paris

N° 305 587-5/PC 97 G 280


1 245 2 02 0

N° 305 587-5

S.N. PRIX
13,85
S.H.Ph.O.30
F.14,15
PCA 76-60/P

LOT N°
D3-308
A utiliser avant
MAI.78





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Seringue injectable de Kenacort retard (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=15032>, consulté le 2026-07-27