

SCHÉMAS DES FORMATIONS SECONDAIRES DE LA TIGE

FICHE N° 718

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Agronomie, Santé

Sous-domaines : Pharmacologie

Organisme : Centre Hospitalier Universitaire de Nantes

Ville : Nantes

Modèle :

Matériaux :

Description

Aquarelle dessinée à la main sur une planche en papier.


Chez les plantes à fleur, la tige est la partie du végétal qui est le support de la fonction reproductrice sexuée. Elle porte les organes mâles et les organes femelles .

Utilisation

Cette planche botanique était utilisée pour l'enseignement en botanique.

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

SCHEMAS des FORMATIONS SECONDAIRES dans la tige



FORMATIONS SECONDAIRES DANS UNE TIGE PENDANT LA PREMIÈRE ANNÉE : **1** état avant leur développement ; **2** état à la fin de la première année avant toute exfoliation.
 Ep. épiderme, Ec. écorce, Cgsc. couche génératrice subéro-corticale, Lp. libre primitif, Cgll. couche génératrice libéro-ligneuse, Bp. bois primitif, Rmp. rayons médullaires primitifs, B'. bois primaire, L'. libre primaire, Lg. liège, Rms. rayons médullaires secondaires, M. moelle.

(Vernier, *Leçons d'anatomie et de physiologie végétales*, page 300 fig. 112.)

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Schémas des formations secondaires de la tige (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=711>, consulté le 2026-07-19